

ترکیب: دانش شما + ممتوای بی نظیر تدریس ما



«آسان و روان، حرفه‌ای و متمایز تدریس کنید.»





«چاپ تمام رنگی جزوه اختصاصی شما برابر هزینه فایل»

(مذف هزینه چاپ)



کلاس ایده‌ال:



سرعت آموزش خود را دو برابر کنید!

(رفع مشکل کمبود وقت برای تدریس کامل کتاب)



پیشنهادات ویژه چاپ:

چاپ کلاسی: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد تخفیف برای سفارش ۱۰ جلد یا بیشتر.

چاپ تک جلد: بدون هزینه اضافه، معادل هزینه فایل در آدرستان تحویل می‌شود.


(یک جلد هدیه نسخه خودآموز به مدرس در سفارشات ۲۰ جلد یا بیشتر)

(نسخه تدریس در دست شاگردان)

پلد نمونه از نتایج درفشان برفی از همکاران مجموعه درس آموزه: **(خرداد و تابستان ۱۴۰۴)**

- از یک جمع چند نفره خصوصی، تمام افراد نمره ۱۹/۵ یا ۱۹/۷۵ کسب کردند؛ (حسابان دوازدهم نهایی)
- از یک گروه ۲۷ نفره در آموزشگاه، چند نفر ۲۰ و اکثراً نمره بالاتر از ۱۵ نهایی و از یک گروه ۱۱ نفره، پنج نفر نمره ۱۹/۵ یا بالاتر و هیچ کدام کمتر از ۱۸ نبودند؛ (دوازدهم انسانی نهایی)
- از جمع شاگردان فقط یکی از اساتید، کسب ۱۰ رتبه دو رقمی منطقه ۲ در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی. (کنکور ۱۴۰۴)
- کسب درصد ریاضی فقط ۳ درصد کمتر از رتبه یک کنکور تجربی. (کنکور ۱۴۰۲)

محتوای تشریحی و نهایی



(خدمات منحصر به فرد گروه درس آموز)

اطلاعات شخصی مدرس، لوگو و تبلیغات شخصی یا مدرسه یا آموزشگاه، روش‌های ارتباطی با شما و ... روی جلد و در تمام صفحات درسنامه، به زیباترین شکل ممکن درج می‌شود.

و

در کل مجموعه، هیچ نام یا نشانی از گروه ما درج نمی‌شود.



۱

نظریه اعداد (۱)

۲

انواعی از استدلال، بخش‌پذیری در
عددهای صحیح و الگوریتم تقسیم،
ب.م.م و ک.م.م عددهای صحیح

۴

مدل‌سازی با گراف

۷۱

مفهوم احاطه‌گری و مجموعه‌ی احاطه‌گر،
مجموعه‌ی احاطه‌گر می‌نیمال، مجموعه‌ی
احاطه‌گر می‌نیمم و تعیین عدد احاطه-
گری

۳

گراف

۴۹

معرفی گراف، مفاهیم مربوطه و نمودار
آن، زیر-گراف و گراف مکمل، انواع
گوناگونی از گراف‌ها

۲

نظریه اعداد (۲)

۲۹

هم‌نهشتی عددها و قوانین آن، تعیین
باقی‌مانده تقسیم اعداد و قوانین بخش-
پذیری، معادلات هم‌نهشتی و سیاله و
تکنیک حل

۶

ترکیبیات (۲)

۱۱۳

اصل شمول و عدم شمول و کاربردهایی
از آن، اصل لانه کبوتری و برخی
کاربردهای آن

۵

ترکیبیات (۱)

۸۸

اصول شمارش و برخی تکنیک‌ها، تعداد
دسته گل‌ها و کاربرد آن در برخی
مسائل مهم شمارش، مربع‌های لاتین و
برنامه‌ریزی



آموزش: ریاضیات گسسته



نظریه اعداد (۱)

صفحه	فهرست
۳	■ انواعی از استدلال
۱۳	■ بخش پذیری در \mathbb{Z}
۲۴	■ ب.م.م. و ک.م.م. اعداد



1 انواعی از استدلال

یادآوری:

«گزاره» به یک حکم (یا ادعا) گفته می‌شود که یا دقیقاً درست است و یا دقیقاً نادرست.

توجه کنید:

اگر گزاره در تمام حالات ممکن درست باشد، گوییم آن گزاره درست است، ولی: برای نادرست بودن آن، کافی است فقط در یک مورد نادرست شود. بنابراین، در مواجهه با یک گزاره، در کل دو راه برای روشن کردن وضعیت آن وجود دارد.

رد کردن یا **اثبات درستی**

برای رد یک ادعای کلی، روش زیر را به کار می‌بریم.

مثال نقض:

برای نشان دادن این که یک حکم کلی نادرست است، کافی است مثالی آورده شود که کلیت آن حکم را رد کند. به چنین مثالی، «**مثال نقض**» گفته می‌شود.

توجه کنید:

الف) اگر بتوانیم برای یک حکم مثال نقض بیاوریم، در واقع اثبات کرده‌ایم که آن حکم نادرست است.
ب) اگر نتوانیم مثال نقض پیدا کنیم، در گام بعدی باید به دنبال اثبات قطعی آن حکم باشیم که در ادامه دو روش کلی مستقیم و غیر مستقیم برای آن خواهیم دید. به یاد داشته باشید:

هر تعداد مثال در تأیید یک حکم آورده شود (یعنی: استدلال استقرایی)، باعث اثبات آن حکم نخواهد شد.

زیرا:

ممکن است مثال نقض وجود داشته باشد، ولی از دید ما پنهان بوده و در آینده یا توسط شخص دیگری پیدا شود.

🌟 **مثال:** درستی یا نادرستی گزاره‌ی زیر را تعیین کنید.

برای هر عدد طبیعی n بزرگ‌تر از ۱، عدد $2^n - 1$ اول است.

پاسخ ✓

توجه:

مثالی که برای نقض یک حکم کلی آورده می‌شود، باید دارای دو شرط زیر باشد:

- فرض عبارت داده شده را برقرار سازد، ولی:
- حکم آن عبارت نادرست شود.

توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



✨ **مثال:** گزاره‌ی درست را اثبات کرده و برای گزاره‌ی نادرست مثال نقض بیاورید.

الف) مجموع دو عدد گنگ، عددی گنگ است.

ب) هیچ دو عدد صحیح مانند x و y وجود ندارد که تساوی $x^2 + y^2 = (x + y)^2$ برقرار باشد. (نهایی؛ خرداد ۱۴۰۰)

پاسخ ✓

✨ **مثال:** حکم «حاصل جمع سه عدد گنگ، عددی گنگ است.» را با مثال نقض رد کنید.

پاسخ ✓

نهایی؛ خرداد ۱۴۰۴

حاصل ضرب هر عدد گویا در یک عدد گنگ، عددی گنگ است. (درست □ - نادرست □)

جواب:

✨ **مثال:** نشان دهید گزاره‌ی زیر نادرست است:

$$\forall x \in \mathbb{N}; \sim (x \in P \wedge x \in E)$$

(P مجموعه‌ی اعداد اول و E مجموعه‌ی اعداد طبیعی زوج.)

پاسخ ✓

چنان که گفتیم، ممکن است نتوانیم هیچ مثال نقضی پیدا کنیم و تمام مثال‌ها حکم را تایید کنند. در این صورت، توجه کنید:

اولاً: درستی قطعی آن حکم را نمی‌توان پذیرفت، چون امکان دارد مثال بعدی، یک مثال نقض باشد.

ثانیاً: وقتی چندین مثال یک حکم را تایید می‌کنند، احتمال درست بودن حکم تقویت می‌شود.

در ریاضیات، در چنین حالتی:

حکم را به عنوان یک «مدس» یا «فرضیه» می‌پذیریم.

برای این که فرضیه یا حدس تایید قطعی شود، نیاز به اثبات دارد که توسط دو مؤلفه‌ی زیر انجام می‌شود.

توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



❖ مقایق پذیرفته شده

اصول و احکامی که قبلاً درستی آن‌ها پذیرفته یا اثبات شده است.

❖ روش‌های درست استنتاج

معمولاً حقایق پذیرفته شده‌ی قبلی با روش‌های درست استدلال، مفروضات مسأله را به کار می‌برند تا یک حکم جدید اثبات شود.

👉 حقایق پذیرفته شده:

برخی حقایق پذیرفته شده که در اثبات‌ها فراوان به کار می‌روند را ببینید:

- هر عدد زوج به صورت $2k$ و هر عدد فرد به صورت $2k-1$ است.
 - هر عدد گویا را می‌توان به صورت کسر $\frac{m}{n}$ نوشت که m و n دو عدد صحیح بوده و مخرج غیر صفر است.
- بعلاوه:

هر عددی که نتوان آن را به صورت کسر گویا نوشت، گنگ است.

برای نمونه:

عددهای π ، $\sqrt{2}$ ، $\sqrt{3}$ و $\sqrt{5}$ همگی گنگ هستند.

▪ عددهای طبیعی یا صحیح متوالی به صورت زیر هستند:

$$k-1, k, k+1, k+2, k+3, \dots$$

▪ عددهای متوالی زوج به صورت:

$$2k-2, 2k, 2k+2, 2k+4, \dots$$

و عددهای متوالی فرد به صورت زیر هستند:

$$2k-1, 2k+1, 2k+3, 2k+5, \dots$$

👉 روش‌های اثبات:

می‌توان روش‌های اثبات احکام ریاضی را در دو نوع کلی طبقه بندی کرد:

اثبات مستقیم و اثبات غیرمستقیم

❖ اثبات مستقیم

در روش‌هایی که در این گروه جای می‌گیرند، فرض مسأله و حقایق قبلی به طور مناسب به کار رفته، حکم تایید می‌شود و اثبات صورت می‌پذیرد.

❖ اثبات غیر مستقیم

در این گروه از روش‌های اثبات، به نوعی حکم مسأله و حقایق قبلی را مورد استفاده قرار داده و درست بودن حکم را نتیجه می‌گیریم.

🌟 **مثال:** چند نمونه اثبات به روش مستقیم ببینید:

- حاصل جمع یا تفریق دو عدد زوج یا دو عدد فرد، همواره زوج است. دلیل:

$$2k + 2k' = 2(\underbrace{k + k'}_{=k''}) = 2k''$$

توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



$$2k - 1 + 2k' - 1 = 2 \underbrace{(k + k' - 1)}_{=k} = 2k''$$

اما اگر یکی زوج و دیگری فرد باشد، حاصل فرد است. دلیل:

$$2k + 2k' - 1 = 2 \underbrace{(k + k')}_{=k} - 1 = 2k'' - 1$$

• حاصل ضرب دو عدد فرد، فرد بوده و در غیر این صورت حاصل ضرب زوج است:

$$(2k - 1)(2k' - 1) = 4kk' - 2k - 2k' + 1 = 2 \underbrace{(2kk' - k - k')}_{=k} + 1 = 2k'' + 1$$

حاصل فرد است.

$$(2k - 1) \times 2k' = 4kk' - 2k' = 2 \underbrace{(2kk' - k')}_{=k} = 2k''$$

حاصل زوج است.

• حاصل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم دو عدد گویا همیشه عددی گویا است. (در تقسیم باید مخرج غیر صفر باشد).

$$\frac{m}{n} \pm \frac{p}{q} = \frac{mq \pm np}{nq} \quad \text{و} \quad \frac{m}{n} \times \frac{p}{q} = \frac{mp}{nq} \quad \text{و} \quad \frac{m}{n} \div \frac{p}{q} = \frac{m}{n} \times \frac{q}{p} = \frac{mq}{np}$$

مثال: نشان دهید مربع هر عدد زوج، زوج و مربع هر عدد فرد هم فرد است.

پاسخ

مثال: درستی یا نادرستی گزاره‌ی زیر را تعیین کنید.

مجموع هر دو عدد فرد، عددی زوج است.

پاسخ

بررسی تمام حالات:

گاهی استفاده از تکنیک زیر، در اثبات مستقیم احکام مورد نیاز است:

تفکیک فرض به تمام حالت‌های ممکن، و بررسی درستی حکم در هر حالت.

به هم‌ارزی زیر بین گزاره‌ها توجه کنید:

$$\begin{aligned} (P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_k) \Rightarrow q &\Leftrightarrow \sim (P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_k) \vee q \\ &\Leftrightarrow (\sim P_1 \wedge \sim P_2 \wedge \dots \wedge \sim P_k) \vee q \\ &\Leftrightarrow (\sim P_1 \vee q) \wedge (\sim P_2 \vee q) \wedge \dots \wedge (\sim P_k \vee q) \\ &\Leftrightarrow (P_1 \Rightarrow q) \wedge (P_2 \Rightarrow q) \wedge \dots \wedge (P_k \Rightarrow q) \end{aligned}$$

یعنی:

اگر فرض در کل به حالت‌های P_1, P_2, \dots و P_k تفکیک شده و هر کدام از آن‌ها درستی q را نشان دهند، درستی q در کل اثبات می‌گردد.

توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



مثال: نشان دهید حاصل ضرب هر دو عدد صحیح متوالی، زوج است.

پاسخ ✓

مثال: نشان دهید برای هر عدد طبیعی n ، عدد $n^2 - 5n + 7$ فرد است.

پاسخ ✓

مثال: نشان دهید نتیجه گیری زیر برای اعداد درست است:

$$ab = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$$

پاسخ ✓

در ادامه، دو روش در اثبات غیر مستقیم و نمونه‌هایی از هر کدام ببینید:

برهان خلف:

برای استفاده از این روش، طبق گام‌های زیر عمل می‌کنیم:

- حکم مورد نظر را نادرست در نظر می‌گیریم؛ یعنی فرض می‌کنیم حکم نادرست باشد.
- با توجه به فرض مرحله‌ی قبل و بیان استدلالی مناسب، «حقایق شناخته شده» یا «فرض» آن قضیه یا مسأله را نقض می‌کنیم.
- نتیجه می‌گیریم حکم آن مسأله نمی‌تواند نادرست باشد و از ابتدا صحیح بوده است.

مثال: نشان دهید اگر n^2 فرد باشد، آنگاه n هم فرد است.

پاسخ ✓

نمونه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.

**توجه کنید:**

حکم: «اگر n^2 زوج باشد، آنگاه n زوج است.» نیز به روش مشابه اثبات می‌شود.

مثال: اگر a و b دو عدد صحیح بوده و ab فرد باشد، به روش برهان خلف نشان دهید: $a^2 + b^2$ عددی زوج است.

پاسخ ✓

مثال: نشان دهید حاصل جمع یک عدد گویا و یک عدد گنگ، همواره گنگ است.

پاسخ ✓

مثال: اگر α و β دو عدد گنگ و $\alpha + \beta$ گویا باشد، نشان دهید عدد $\alpha + 2\beta$ گنگ است.

پاسخ ✓

مثال: در مورد گویا یا گنگ بودن «حاصل ضرب یک عدد گویا در یک عدد گنگ» چه می‌توان گفت؟ ادعای خود را ثابت کنید.

پاسخ ✓

مثال: (از متن کتاب) a_1, a_2, \dots, a_m و b_1, b_2, \dots, b_m هم همان اعداد ولی با ترتیب دیگری قرار گرفته‌اند. ثابت کنید $(a_1 - b_1)(a_2 - b_2) \dots (a_m - b_m)$ عددی زوج است.

پاسخ ✓



روش دوم در اثبات غیر مستقیم:

اثبات بازگشتی:

در اثبات به طریق بازگشتی به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

- درستی حکم را موقتاً می‌پذیریم.
- با شروع از حکم، در چند مرحله به یک رابطه‌ی بدیهی یا فرض داده شده می‌رسیم.
- اکنون اگر تمام مراحل را بتوان از آخر به اول نتیجه گرفت، یعنی استنتاج‌های انجام شده برگشت‌پذیر باشند، درستی حکم تأیید می‌شود.

توجه کنید:

الف) برگشت‌پذیری استنتاج $p \Rightarrow q$ ، یعنی:

استنتاج $q \Rightarrow p$ نیز درست باشد.

در این صورت؛ p و q حتماً ارزش یکسان دارند؛ و می‌نویسیم: $p \Leftrightarrow q$.

بویژه:

«درستی هر کدام، درستی دیگری را نتیجه می‌دهد؛ به بیان دیگر هم‌ارز هستند.»

ب) یک استنتاج درست، ممکن است برگشت‌پذیر باشد یا نباشد؛ نمونه‌هایی ببینید:

- استنتاج « $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ » برگشت‌پذیر نیست؛ زیرا نتیجه‌گیری « $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ » نادرست می‌باشد. در واقع:

درستی $x^2 = 4$ ، درستی $x = 2$ را نتیجه نمی‌دهد. (می‌تواند $x = -2$ باشد).

- استنتاج « $2x = 4 \Rightarrow x = 2$ » برگشت‌پذیر است؛ زیرا « $x = 2 \Rightarrow 2x = 4$ » نیز درست می‌باشد. پس می‌توانیم بنویسیم:

$$x = 2 \Leftrightarrow 2x = 4$$

- استنتاج « $x < y + 2 \Rightarrow x - y < 2$ » نیز برگشت‌پذیر می‌باشد؛ زیرا « $x - y < 2 \Rightarrow x < y + 2$ » درست است.

🌟 **مثال:** درستی یا نادرستی هم‌ارزی‌های زیر را بررسی کنید.

الف) n فرد است. $\Leftrightarrow n^2$ فرد است.

ب) m و n زوج هستند. $\Leftrightarrow mn$ زوج است.

پ) $x < 0 \Leftrightarrow x^3 < 0$

توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



تذکر مجدد:

در کاربرد روش بازگشتی، باید مانند برخی مواردی که آورده شد، تمام نتیجه گیری‌ها برگشت پذیر باشند.

مثال: نامساوی $a + \frac{1}{a} \geq 2$ را برای $a > 0$ نشان دهید.

پاسخ

توجه:

از این پس، با اطمینان از بازگشت پذیری هر استنتاج، به جای \Rightarrow ، نماد \Leftrightarrow را به کار می‌بریم.

نهایی؛ خرداد ۱۴۰۰

به روش بازگشتی ثابت کنید: حاصل ضرب هر دو عدد حقیقی، کوچک‌تر یا مساوی نصف مجموع مربعات آن‌ها است.

پاسخ

مثال: ثابت کنید: میانگین حسابی دو عدد نامنفی از میانگین هندسی آن‌ها کمتر نیست.

پاسخ

نهایی؛ خرداد ۱۴۰۴

نامساوی زیر را به روش بازگشتی (گزاره‌های هم‌ارز)، برای هر دو عدد حقیقی a و b نشان دهید:

$$5a^2 + b^2 \geq 4ab$$

پاسخ

نهایی؛ خرداد ۱۴۰۳

نامساوی زیر را توسط اثبات بازگشتی برای اعداد حقیقی x و y نشان دهید:

$$x^2 + y^2 \geq (x-1)(y+1)$$

نمونه فرم‌بند:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.

پاسخ ✓

مثال: ✨ نامساوی $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + xz + yz$ را برای اعداد حقیقی x, y و z نشان دهید.

پاسخ ✓

؟ پاسخ دهید (۱)

۱- تساوی یا ادعاهای زیر را با استفاده از مثال نقض رد کنید.

الف) $\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$

ب) $\sqrt{xy} = \sqrt{x}\sqrt{y}$ (تساوی تحت چه شرایطی همواره صحیح است؟)

پ) $[x+y] = [x] + [y]$ ([] به معنای جزء صحیح است.)

ت) از تساوی $A \cup B = A \cup C$ بین مجموعه‌ها نتیجه می‌شود که $B = C$ است.

۲- مجموعه‌ی $S = \{1, 2, \dots, 6\}$ و زیرمجموعه‌ی $A = \{3, 4\}$ از آن را در نظر بگیرید. اگر برای $n \in S$ حاصل $\frac{n^2(n+1)^2}{4}$ عددی زوج باشد، ثابت کنید $n \in A$ است.

۳- با روش برهان خلف و استفاده از تکنیک بررسی تمام حالات، حکم زیر را ثابت کنید:

اگر n^2 مضرب ۵ باشد، آنگاه n نیز مضرب ۵ است.

آیا ادعای زیر نیز صحیح است؟

اگر n^2 مضرب ۴ باشد، آنگاه n نیز مضرب ۴ است.

۴- اگر a و b دو عدد صحیح بوده و ab فرد باشد، نشان دهید: $a^2 + b^2$ عددی زوج است.

۵- نشان دهید حکم زیر نادرست است:

حاصل ضرب یک عدد گویا در یک عدد گنگ، همواره گنگ است.

۶- ادعای زیر را ثابت کنید:

توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



حاصل ضرب یک عدد گویای غیر صفر در یک عدد گنگ، همواره گنگ است.

۷- درستی ادعاهای زیر را با استفاده از برهان خلف ثابت کنید.

الف) اگر x یک عدد گنگ باشد، آنگاه $\frac{1}{x}$ نیز گنگ است.

ب) اگر تابع f در $x=a$ پیوسته و تابع g در $x=a$ ناپیوسته باشد، آنگاه تابع $f+g$ در $x=a$ ناپیوسته است.

۸- می‌دانیم $\sqrt{2}$ عددی گنگ است. نشان دهید:

عددهای $\sqrt{2}+1$ و $\sqrt{2}-\sqrt{3}$ گنگ هستند.

۹- اگر α و β دو عدد گنگ و $\alpha+\beta$ گویا باشد، نشان دهید $\alpha-\beta$ گنگ است.

۱۰- به روش بازگشتی ثابت کنید.

الف) $2(a^n + b^n) \geq (a+b)^n$ (a و b دو عدد حقیقی)

ب) $(\frac{1}{x} + \frac{1}{y})(x+y) \geq 4$ (x و y دو عدد مثبت)

۱۱- اگر $a, b \in \mathbb{R}$ باشند، کدامیک از ترکیب‌های دو شرطی زیر درست است؟

الف) $a < b \Leftrightarrow a^2 < b^2$ (الف) $a < b \Leftrightarrow a^3 < b^3$ (ب)

متن‌ب کتاب:

۱- آیا اعدادی صحیح مانند a و b وجود دارند که: $a^n + b^n = (a+b)^n$

۲- آیا مقادیر حقیقی و ناصفر a و b چنان وجود دارند که:

$$\frac{1}{a+b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \quad (a+b \neq 0)$$

۳- گزاره‌های زیر را اثبات یا با ارائه مثال نقض رد کنید.

الف) مربع و مکعب هر عدد فرد، عددی فرد است.

ب) میانگین پنج عدد طبیعی متوالی، عدد وسطی آن‌ها است.



بخش پذیری در \mathbb{Z}

به بیان دقیق مفهوم «بخش پذیری» در اعداد صحیح توجه کنید.

بخش پذیری:

فرض کنید a و $b \neq 0$ عددهایی صحیح باشند.

عدد a را بر b «بخش پذیر» گوئیم، هرگاه عدد صحیح k یافت شود که $a = bk$. در این صورت می نویسیم: $b|a$. بنابراین:

$$b|a \Leftrightarrow a = bk, \quad k \in \mathbb{Z}$$

برای نمونه:

داریم: $4|-12$ ، زیرا عدد -12 را می توان به صورت $4 \left(\underbrace{-3} \right)_k$ نوشت.

اگر چنین عدد k وجود نداشته باشد، می نویسیم: $b \nmid a$. برای نمونه:

$4 \nmid 10$ ، زیرا ضرب عدد 4 در هیچ عدد صحیحی برابر 10 نخواهد شد: $10 \neq 4k$.

بعلاوه:

عبارت $b|a$ به صورت زیر خوانده می شود:

« b عاد می کند a را» یا « b عدد a را می شمارد.»

(توجه کنید: b یک شمارنده یا مقسوم علیه صحیح a است.)

خواص بدیهی:

تمام اعداد بر 1 و -1 بخش پذیر هستند؛ یعنی همواره: $\pm 1|a$.
دلیل:

$$a = 1 \times a \rightarrow 1|a \quad \text{و} \quad a = -1 \times (-a) \rightarrow -1|a$$

تمام اعداد صحیح، عدد صفر را عاد می کنند، زیرا: $0 = a \times 0$. به عبارت دیگر:

صفر تنها عددی است که بر تمام اعداد بخش پذیر است، یعنی همواره: $a|0$.

هیچ عددی بر صفر بخش پذیر نیست. ولی چون تساوی $0 = 0 \times k$ برای هر عدد صحیح k برقرار است، خواهیم داشت: $0|0$. بنابراین:

$$0|a \Rightarrow a = 0$$

یعنی:

عدد صفر فقط خودش را عاد می کند.

هر عددی بر خودش بخش پذیر است؛ زیرا:

$$a = a \times 1 \Rightarrow a|a$$

توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



به صورت مشابه، موارد: $a|-a$ و $-a|a$ نیز درست هستند. یعنی: $\pm a|\pm a$

مثال: (خواص ساده)

الف) نشان می‌دهیم برای هر عدد طبیعی n داریم:

$$a|a^n$$

در حالت $n=1$ ، رابطه‌ی بدیهی $a|a$ را داریم که درست است. اگر $n > 1$ باشد، در این صورت:

$$a^n = a \times \underbrace{a^{n-1}}_{=k} \rightarrow a^n = ak \Rightarrow a|a^n$$

ب) کلی‌تر از قسمت قبل، اگر $0 \leq m \leq n$ باشد، داریم: $a^m|a^n$. زیرا:

$$a^n = a^m \times \underbrace{a^{n-m}}_{=k} \rightarrow a^n = a^m k \Rightarrow a^m|a^n$$

پ) نشان می‌دهیم اگر $a|b$ ، آنگاه برای هر عدد طبیعی n داریم:

$$a^n|b^n$$

حالت $n=1$ بدیهی است. اگر $n > 1$ باشد، چون $b = ak$ است، در این صورت:

$$b^n = (ak)^n = a^n \times \underbrace{k^n}_{=k'} \rightarrow b^n = a^n k' \Rightarrow a^n|b^n$$

یادآوری یک مفهوم بسیار پر کاربرد در مبحث نظریه اعداد:

عدد اول:

عدد طبیعی $p > 1$ را «**اول**» گوئیم؛ هرگاه غیر از ۱ و خودش هیچ مقسوم‌علیه مثبتی نداشته باشد.

بنابراین، اگر p عددی اول باشد:

$$a|p \Rightarrow a = \pm 1, a = \pm p$$

سایر اعداد طبیعی بزرگ‌تر از یک را «**مركب**» گوئیم. بنابراین:

عدد ۱ نه اول است و نه مركب.

در ادامه ویژگی‌های اصلی شمارش، دلیل هر کدام و برخی کاربردهای آنها را ببینید.

ویژگی ۱:

اگر a عدد b را عاد کند، a هر مضربی از b را نیز عاد می‌کند؛ یعنی برای هر عدد صحیح m :

$$a|b \Rightarrow a|bm$$

برای نمونه:

$$5|10 \Rightarrow 5|20, 5|-10, 5|50, \dots$$

دلیل:

توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



بررسی حالاتی مشابه ویژگی قبل:

مثال: برای نتیجه گیری زیر دلیل بیاورید:

$$a|b, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow ak|bk$$

آیا عکس آن هم صحیح است؟

$$ak|bk, k \in \mathbb{Z} \stackrel{?}{\Rightarrow} a|b$$

پاسخ

ویژگی ۲:

شمارش، خاصیت تعدی دارد. یعنی:

اگر a بر b و b بر c بخش پذیر باشد، آنگاه: a بر c بخش پذیر است.

با صورت نمادین:

$$c|b \wedge b|a \Rightarrow c|a$$

برای نمونه؛

از این که $6|12$ و $12|48$ می توان نتیجه گرفت: $6|48$.

دلیل:

مثال: نشان می دهیم از $a|b$ ، نتیجه می شود برای هر عدد طبیعی n داریم:

$$a|b^n$$

زیرا:

قبلاً دیدیم که همواره $b|b^n$ است و در نتیجه طبق ویژگی قبل:

$$a|b \wedge b|b^n \Rightarrow a|b^n$$

توجه کنید:

■ برای عددهای صحیح a و b ، با توجه به تجزیه ی عبارت های $a^n \pm b^n$:

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

$$a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots - ab^{n-2} + b^{n-1}) \quad (n \text{ فرد})$$

توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



همواره رابطه‌ی $a-b \mid a^n - b^n$ برقرار است.

نتیجه:

اگر n زوج باشد، آنگاه: $a+b \mid a^n - b^n$. (چرا؟)

اگر n فرد باشد، آنگاه: $a+b \mid a^n + b^n$.

مثال: اگر داشته باشیم $a^2 \mid b-c$ ، نشان دهید: $a^2 \mid b^n - c^n$.

پاسخ

ویژگی ۳:

این ویژگی به صورت زیر بیان می‌شود:

اگر دو عدد بر عددی بخش پذیر باشند، آنگاه جمع و تفریق آن‌ها هم بر آن عدد بخش پذیر است.

با نماد ریاضی:

$$a \mid b \wedge a \mid c \Rightarrow a \mid b \pm c$$

دلیل:

نتیجه گیری:

برای عددهای صحیح m و n همواره داریم:

$$a \mid b \wedge a \mid c \Rightarrow a \mid bm \pm cn$$

دلیل این مطلب، با توجه به ویژگی‌های اول و سوم بدیهی است.

نهایی؛ خرداد ۱۴۰۳

فرض کنید $a \in \mathbb{N}$ ، $a \mid 7k+1$ و $a \mid 4k+3$. ثابت کنید: $a=1$ یا $a=17$.

پاسخ

مثال: اگر $2n-1 \mid 2n^2+1$ ، جواب‌های طبیعی n را مشخص کنید.

توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



پاسخ

نهایی؛ خرداد ۱۴۰۱

اگر عددی مانند k در \mathbb{Z} باشد به طوری که $۵ \mid ۴k + ۱$ ، ثابت کنید: $۲۵ \mid ۱۶k^۲ + ۲۸k + ۶$.

پاسخ

مثال: عددهای طبیعی n را چنان مشخص کنید که $\frac{۳n^۲ + ۲n - ۶}{n - ۳}$ عددی صحیح باشد.

پاسخ

ویژگی ۴:

اگر داشته باشیم: $a \mid b$ و $b \neq ۰$ باشد، آنگاه $|a| \leq |b|$. به صورت نمادین:
 $a \mid b \wedge b \neq ۰ \Rightarrow |a| \leq |b|$

به بیان ساده:

یک عدد مثبت نمی‌تواند بر عددهای بزرگ‌تر از خود بخش‌پذیر باشد.

دلیل:

نمونه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



مثال: اگر a و b عددهایی صحیح و غیر صفر باشند، نشان دهید:

$$a|b \wedge b|a \Rightarrow a = \pm b$$

پاسخ

مثال: برای موارد زیر دلیل بیاورید.

الف) اگر $a|b$ و $c|d$ ، آنگاه $ac|bd$.

ب) اگر $ac|bc$ و $c \neq 0$ باشد، آنگاه داریم: $a|b$.

مثال: برای عددهای طبیعی a ، b و c با شرایط $a^2|bc$ و $c|a$ ، نشان دهید: $a|b$.

پاسخ

در ادامه، خاصیت مهمی از ضرب عددها و کاربردهایی از آن را ببینید.

مثال: نشان دهید:

الف) حاصل ضرب هر دو عدد صحیح متوالی، همواره زوج است:

$$n(n+1) = 2k$$

ب) در کل: حاصل ضرب n عدد صحیح متوالی، همواره مضرب $n!$ است؛ یعنی بر $n!$ بخش پذیر است.

بویژه:

نتیجه بگیرید: «حاصل ضرب هر سه عدد صحیح متوالی، مضرب ۶ است.»



مثال: (مهم) نشان دهید مربع هر عدد فرد به صورت $8k+1$ است.

پاسخ ✓

توجه کنید:

بیان مهم دیگری از حکم مثال قبل چنین است: «باقی مانده‌ی تقسیم مربع هر عدد فرد بر ۸ برابر ۱ است.»

مثال: نشان دهید اگر k عددی زوج باشد، $k^3 - 4k$ همواره مضرب ۴۸ است.

پاسخ ✓

در پایان، حالتی را بررسی می‌کنیم که عددها بر هم بخش‌پذیر نیستند.

قضیه تقسیم:

در تقسیم عدد صحیح a بر عدد طبیعی b ، اعداد صحیح و یکتای q و r وجود دارند که:

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

عددهای q و r به ترتیب «**خارج قسمت**» و «**باقی مانده**» تقسیم a بر b نام دارند.

توجه کنید:

در تقسیم a بر b همواره می‌توان:

- خارج قسمت را توسط جزء صحیح $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$ و سپس:
- باقی مانده را از رابطه‌ی $r = a - bq$ به دست آورد.

مثال: خارج قسمت و باقی مانده‌ی تقسیم عددهای ۳۱ و -۳۱ بر ۷ را تعیین کنید.

پاسخ ✓



مثال: (از کتاب) اگر باقی مانده‌ی تقسیم اعداد m و n بر ۱۷ به ترتیب ۵ و ۳ باشند، باقی مانده‌ی تقسیم عدد $۲m - ۵n$ بر ۱۷ را تعیین کنید.

پاسخ ✓

مثال: اگر باقی مانده‌ی تقسیم عدد a بر ۴ برابر ۳ باشد، باقی مانده‌ی تقسیم عدد $۲a + ۳$ بر ۸ را تعیین کنید.

پاسخ ✓

نهایی؛ خرداد ۱۴۰۳

اگر باقی مانده‌ی تقسیم عدد a بر دو عدد ۴ و ۵ به ترتیب برابر ۲ و ۳ باشد، باقی مانده‌ی تقسیم عدد a بر ۲۰ را بیابید.

پاسخ ✓

به یک کاربرد مهم از قضیه‌ی تقسیم توجه کنید:

افراز اعداد صحیح:

فرض کنید $m > 1$ عدد طبیعی ثابتی باشد. عدد صحیح دلخواه a را در نظر گرفته و آن را بر m تقسیم می‌کنیم:

$$a = mk + r ; \quad r = 0, 1, 2, \dots, m-1$$

می‌بینید که می‌توان عددهای صحیح را بر حسب باقی مانده تقسیم بر m در یک مجموعه قرار داد.

• اگر باقی مانده صفر باشد، عددها به صورت زیر هستند:

$$a = mk, \quad k \in \mathbb{Z}$$

مجموعه‌ی تمام این نوع اعداد را با $[0]_m$ نشان می‌دهیم:

$$[0]_m = \{mk \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

• اگر باقی مانده‌ی تقسیم برابر ۱ شود، عددها به این صورت هستند:

$$[1]_m = \{mk + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

• سایر عددهای صحیح نیز به یکی از صورت‌های زیر خواهند بود:

نمونه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



$$\begin{aligned} [2]_m &= \{mk + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ [3]_m &= \{mk + 3 \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ &\vdots \\ [m-1]_m &= \{mk + m - 1 \mid k \in \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

بنابراین:

با انتخاب عدد طبیعی m ، مجموعه‌ی \mathbb{Z} دقیقاً به تعداد m زیر مجموعه افراز می‌شود:

$$[0]_m, [1]_m, [2]_m, \dots, [m-1]_m$$

یعنی:

- این مجموعه‌ها هیچ کدام تهی نیستند.
- دو به دو اشتراک ندارند.
- هر عدد صحیح در یکی از آن‌ها جای دارد.

برای نمونه:

برای $m = 4$ دقیقاً چهار قسمت افراز چنین هستند:

$$\begin{aligned} [0]_4 &= \{4k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\} \\ [1]_4 &= \{4k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, 13, \dots\} \\ [2]_4 &= \{4k + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, 14, \dots\} \\ [3]_4 &= \{4k + 3 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, 15, \dots\} \end{aligned}$$

به یاد داشته باشید:

هر عدد صحیح a بر حسب عدد طبیعی m به یکی از صورت‌های زیر قابل نوشتن است:

$$mk, mk + 1, mk + 2, \dots, mk + m - 1$$

برای نمونه:

بر حسب $m = 5$ ، هر عدد صحیح دقیقاً به یکی از حالت‌های زیر قابل نوشتن است:

$$5k, 5k + 1, 5k + 2, 5k + 3, 5k + 4$$

مثال: نشان دهید اگر n^2 مضرب ۳ باشد، آنگاه n هم مضرب ۳ است.





نهایی؛ خرداد ۱۴۰۰

ثابت کنید اگر $p \geq 5$ عددی اول باشد، آنگاه به یکی از دو صورت $p = 4k + 1$ یا $p = 4k + 3$ نوشته می‌شود.

پاسخ

مثال: نشان دهید برای عدد صحیح فرد a ، عدد a^4 به صورت $16k + 1$ است.

پاسخ

؟ پاسخ دهید (۲)

۱- تفاضل هر دو عدد دلخواه از مجموعه‌ی $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 4k + 3\}$ مضرب ۴ است. (درست - نادرست)

(نهایی- خرداد ۱۴۰۳)

۲- اگر $a \mid b$ و m و n دو عدد طبیعی باشند که $m \leq n$ ، آنگاه: $a^m \mid a^n$.

۳- اگر k عددی در \mathbb{Z} باشد به طوری که $3 \mid 5k + 1$ ، ثابت کنید: $9 \mid 25k^2 + 25k + 13$.

۴- اگر باقیمانده تقسیم عدد a بر ۷ برابر ۶ باشد، در این صورت باقی‌مانده‌ی تقسیم $2a + 5$ بر ۱۴ را بیابید.

۵- اگر باقی‌مانده‌ی تقسیم اعداد a و b بر ۲۷ به ترتیب برابر ۲۱ و ۷ باشد، باقی‌مانده‌ی تقسیم عدد $2a - 3b$ بر ۲۷ را بیابید.

۶- اگر در تقسیم عددهای ۵۰۷ و ۳۶۸ بر عدد b ، باقی‌مانده‌ها به ترتیب ۱۰ و ۱۳ باشند، مقدار b را بیابید.

۷- با در نظر گرفتن سه حالت $n = 3k$ ، $n = 3k + 1$ و $n = 3k + 2$ ، حکم زیر را ثابت کنید:

اگر n عددی صحیح باشد، آنگاه: $3 \mid n^3 - n$.

نمونه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.

**منتخب کتاب:**

۱- از تساوی $ab = cd$ ، پنج رابطه‌ی عاد کردن نتیجه بگیرید. (هر چهار عدد a ، b ، c و d صحیح و غیر صفر هستند).

۲- برای $a > 1$ ، اگر $a | 9k + 4$ و $a | 5k + 3$ ، ثابت کنید a عددی اول است.

۳- اگر باقی‌مانده‌ی تقسیم عدد a بر ۷ و ۸ به ترتیب ۵ و ۷ باشد، باقی‌مانده‌ی تقسیم a بر ۵۶ را بیابید.

۴- اگر a عدد دلخواه صحیح باشد، ثابت کنید همواره یکی از عددهای a یا $a + 2$ یا $a + 4$ بر ۳ بخش پذیر است.

۵- ثابت کنید تفاضل مکعب‌های دو عدد صحیح متوالی عددی فرد است.



دو مفهوم ب.م.م و ک.م.م کاربردهای زیادی در نظریه اعداد دارند.

ب.م.م اعداد:

فرض کنید a و b دو عدد صحیح باشند که لاقبل یکی از آنها غیر صفر است. عدد طبیعی d را «ب.م.م» یعنی: بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک این دو عدد گوئیم، هرگاه:

- اولاً: $d|a$ و $d|b$ و
 - ثانیاً: سایر مقسوم علیه‌های مشترک a و b از d کوچک‌تر باشند.
- در این صورت می‌نویسیم:

$$(a, b) = d$$

در حالت خاص:

اگر $a|b$ ، آنگاه $(a, b) = |a|$ است. بویژه:

$$(a, a) = |a| \quad \text{و} \quad (a, 0) = |a|$$

البته عبارت $(0, 0)$ بی‌معنی است.

مثال: فرض کنید p عددی اول و a عددی صحیح باشد. نشان دهید:

اگر $p|a$ ، آنگاه: $(a, p) = p$ و در غیر این صورت: $(a, p) = 1$.

پاسخ

نهایی؛ خرداد ۱۴۰۰

جاهای خالی را با عدد یا کلمه مناسب پر کنید.

الف) a و b اعدادی صحیح و a مخالف صفر است. اگر $a|b$ ، آنگاه عدد شمارنده‌ی عدد است.

ب) m عددی صحیح است. حاصل $(2m, 6m^3)$ برابر است.

نهایی؛ خرداد ۱۴۰۴

به ازای چند مقدار a ، تساوی $(2a, 27) = a$ برقرار است؟

۱ ۴ ۸ ۲



حالت خاص زیر در مورد ب.م.م اعداد اهمیت بسیاری دارد.

اعداد متباین:

دو عدد a و b را نسبت به هم «اول» یا «متباین» گوئیم، هرگاه:
 $(a, b) = 1$

به دو مورد در ارتباط با این مفهوم توجه کنید:

- واضح است که $(4, 9) = 1$ و بنابراین متباین بودن اعداد ربطی به اول بودن تک تک آن‌ها ندارد. ولی عکس آن صحیح است:
- اگر p و q دو عدد اول مختلف باشند، همواره: $(p, q) = 1$.
- دو عدد a و b وقتی نسبت به هم اول هستند که در تجزیه‌ی این دو عدد به عددهای اول، عامل اول مشترکی وجود نداشته باشد. برای نمونه؛ چون $48 = 2^4 \times 3$ و $35 = 5 \times 7$ ، بنابراین $(48, 35) = 1$ است.

🌟 **مثال:** نشان دهید عدد ۷۷ نسبت به هر سه عدد ۶۴، ۸۱ و ۱۲۵ اول است.

پاسخ ✓

🌟 **مثال:** نشان دهید: دو عدد فرد متوالی همواره نسبت به هم اول هستند.

پاسخ ✓

🌟 **مثال:** اگر a و b اعدادی صحیح باشند، آنگاه نشان دهید: $(ab+1, a) = 1$.

پاسخ ✓

🌟 **مثال:** نشان دهید حاصل $(a^2 - 4a + 1, a - 3)$ برابر ۱ یا ۲ است. ($a \in \mathbb{Z}$)

پاسخ ✓



اکنون مضرب‌های مشترک دو عدد صحیح را بررسی می‌کنیم.

ک.م.م اعداد:

فرض کنیم a و b دو عدد صحیح باشند که هر دو غیر صفر هستند. عدد طبیعی c را «ک.م.م.» یعنی: کوچک‌ترین مضرب مشترک این دو عدد گوئیم، هرگاه:

- **اولاً:** $a|c$ و $b|c$
 - **ثانیاً:** سایر مضرب‌های مثبت و مشترک a و b از c بزرگ‌تر باشند.
- در این صورت می‌نویسیم:

$$[a, b] = c$$

در یک حالت خاص:

هرگاه $a|b$ ، آنگاه $[a, b] = |b|$ است؛ بویژه:

$$[a, \pm a] = |a| \quad \text{و} \quad [\mp 1, a] = |a|$$

مثال: جای خالی را پر کنید:

$[a, b] = c$ اگر و تنها اگر دو شرط زیر برقرار باشند:

- ۱) $a|c, b|c$ ۲) $\forall m > 0, \dots\dots\dots$

مثال: برای دو عدد صحیح غیر صفر a و b ، مقادیر زیر را حساب کنید.

$$[a, (a, b)] \quad \text{و} \quad (a, [a, b])$$



نهایی؛ خرداد ۱۴۰۳

اگر $m \in \mathbb{Z} - \{0\}$ ، آنگاه: $[m^5, (m^3, m^2)] = m^5$. (درست □ - نادرست □)

جواب:

محاسبه ب.م.م و ک.م.م:

اگر عددهای داده شده را تجزیه کنید، در این صورت:

- ب.م.م. برابر ضرب عامل‌های مشترک با توان کوچک‌تر است.
- ک.م.م. برابر ضرب عامل‌های مشترک با توان بزرگ‌تر ضرب در تمام عامل‌های غیر مشترک است.

نمونه فرماید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.

برای نمونه:

چون $۷۵ = ۳ \times ۵^۲$ و $۴۰ = ۲^۳ \times ۵$ بنابراین داریم:

$$(۴۰, ۷۵) = ۵^۱ = ۵ \quad \text{و} \quad [۴۰, ۷۵] = ۵^۲ \times ۳ \times ۲^۳ = ۶۰۰$$

از دو مورد بالا می‌توان نتیجه گرفت، بین ب.م.م. و ک.م.م. دو عدد، رابطه‌ی زیر برقرار است:

$$[a, b] = \frac{|ab|}{(a, b)}$$

هنگامی که در مبحث ب.م.م یا ک.م.م به دنبال عددهایی با اطلاعات داده شده هستیم، معمولاً استفاده از تکنیک زیر جستجو را بسیار محدود کرده و در نتیجه دسترسی به جواب آسان‌تر خواهد شد.

تکنیک a' و b' :

ابتدا توجه کنید:

اگر a و b دو عدد صحیح و $(a, b) = d$ باشد، آنگاه $(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) = 1$ است.

اکنون فرض کنید $(a, b) = d$ باشد، آنگاه:

- قرار می‌دهیم: $\frac{a}{d} = a'$ و $\frac{b}{d} = b'$.
- طبق مرحله‌ی قبل خواهیم داشت: $a = a'd$ و $b = b'd$ و البته: $(a', b') = 1$.

همیشه:

به جای این که دنبال اعداد نسبتاً بزرگ a و b بگردید، بهتر است دنبال عددهای کوچک‌تر و متباین a' و b' بگردید!

مثال: مجموع دو عدد طبیعی ۵۰۴ و ب.م.م آن‌ها ۳۶ است. حالت‌های ممکن برای دو عدد را مشخص کنید.

پاسخ

ک.م.م بر حسب a' و b' :

ک.م.م برابر $[a, b] = a'b'd$ است، زیرا:

$$[a, b] = \frac{a'd \times b'd}{d} \Rightarrow [a, b] = a'b'd$$

بویژه:

توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



اگر $(a, b) = 1$ باشد، آنگاه $[a, b] = |ab|$ است.

مثال: ب.م.م دو عدد ۲۳ و ک.م.م آن‌ها ۲۰۹۳ است. عدد بزرگ‌تر را مشخص کنید. (هر دو عدد بزرگ‌تر از ۲۳ هستند.)



پاسخ دهید (۳)

۱- درستی یا نادرستی هر مورد را مشخص کنید.

الف) اگر $a|b$ ، آنگاه $(a, b) = a$.

ب) اگر $a|b$ ، آنگاه $[a, b] = |b|$.

۲- حاصل $[(403, 341), 77]$ را حساب کنید.

۳- اگر $(7k + 6, 9k + 7) = d$ و این دو عدد نسبت به هم اول نباشند، d را بیابید. ($k \in \mathbb{Z}$)

۴- فرض کنید a عددی طبیعی باشد. حاصل $[32a^3, 48a^2]$ را به دست آورید.

۵- اگر مجموع دو عدد ۱۰۲ و ک.م.م آن‌ها ۴۳۲ باشد، ب.م.م آن دو عدد را بیابید.

منتخب کتاب:

۱- موارد زیر را ثابت کنید:

الف) هر دو عدد صحیح و متوالی نسبت به هم اول هستند.

ب) هر دو عدد صحیح و فرد متوالی نسبت به هم اول هستند. (آیا در مورد زوج و متوالی هم درست است؟)

پ) اگر p و q دو عدد اول متمایز باشند، همواره $(p, q) = 1$ است.

۲- برای عدد صحیح m ، حاصل هر مورد را بنویسید.

الف) $([m^2, m], m^5)$

ب) $(2m, 6m^3)$

پ) $(3m+1, 3m+2)$

ت) $([m^2, m^3], m^4)$

ث) $([72, 48], 120)$

لیست کامل مجموعه‌های آموزشی

ریاضی تیزهوشان	متوسطه اول (عادی)	دوره ابتدایی (عادی)
ریاضی تیزهوشان ششم	جزوه ریاضی هفتم	جزوه ریاضی پنجم
ریاضی تیزهوشان هفتم	جزوه ریاضی هشتم	جزوه ریاضی ششم
ریاضی تیزهوشان هشتم	جزوه ریاضی نهم	
ریاضی تیزهوشان نهم		

استعداد تحلیلی (ششم به هفتم)	استعداد تحلیلی (نهم به دهم)
جزوه هوش کلامی (ادبی)	جزوه هوش غیرکلامی (تصویری)
جزوه هوش غیرکلامی (تصویری)	جزوه هوش ریاضی و محاسبات
جزوه هوش ریاضی - منطقی و سرعتی	جزوه هوش منطقی و استدلال (شامل تحلیل متن)

متوسطه دوم (تجربی: کنگوری)	متوسطه دوم (تجربی: تشریحی)
جزوه کنکور ریاضی دهم	جزوه تشریحی ریاضی دهم
جزوه کنکور ریاضی یازدهم	جزوه تشریحی ریاضی یازدهم
جزوه کنکور ریاضی دوازدهم	جزوه تشریحی ریاضی دوازدهم
جزوه جامع کنکور تجربی	

متوسطه دوم (ریاضی: کنگوری)	متوسطه دوم (ریاضی: تشریحی)
جزوه کنکور ریاضی دهم	جزوه تشریحی ریاضی دهم
جزوه کنکور مسابان (۱)	جزوه تشریحی هندسه (۱)
جزوه کنکور آمار و احتمال	جزوه تشریحی هندسه (۲)
جزوه کنکور هندسه (۲)	جزوه تشریحی مسابان (۱)
جزوه کنکور مسابان (۲)	جزوه تشریحی آمار و احتمال
جزوه کنکور ریاضیات گسسته	جزوه تشریحی ریاضیات گسسته
جزوه کنکور هندسه (۳)	جزوه تشریحی هندسه (۳)
جزوه جامع کنکور ریاضی	جزوه تشریحی مسابان (۲)

رشته انسانی
جزوه ریاضی و آمار پایه دهم (تشریحی + کنکور در یک مجموعه، البته تفکیک شده)
جزوه ریاضی و آمار پایه یازدهم (تشریحی + کنکور در یک مجموعه، البته تفکیک شده)
جزوه ریاضی و آمار پایه دوازدهم (تشریحی + کنکور در یک مجموعه، البته تفکیک شده)

ما متمرکز بر ارتقای کیفیت آموزش هستیم.

سپاس از توجهتان



۰۹۳۵ ۶۰۰ ۸۴۵۴
 ۰۹۲۰ ۶۰۰ ۸۴۵۴